ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ХОБЛ

Признак	БА	ХОБЛ
1.Факторы риска		
1.1.Возраст 1.2.Данные анамнеза жизни	Дебют часто в молодом возрасте (детстве) Отягощенный аллергологический анамнез, эмоциональные нагрузки	Дебют в среднем возрасте Курение, профессиональные вредности, продукты сгорания топлива, частые респираторные инфекции
2.Клинические особенности		
2.1.Внелегочные проявления аллергии	Крапивница, атопический дерматит, вазомоторный ринит	–
2.2.Внелегочные соматические проявления	-	Повышеный риск сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороз, мышечная атрофия, кахексия, нормохромная анемия
2.3.Характер кашля, одышки	Приступообразный непродуктивный кашель, одышка, удушье после контакта с аллергеном, холодным воздухом, заканчивающиеся отхождением слизистой, стекловидной мокроты, ночные приступы или рано утром	Постоянный кашель с мокротой (часто гнойной), постепенное нарастание одышки при физической нагрузке (через несколько лет после появления кашля)
2.4.Инфекционно-воспалительный синдром	-	При обострении – лихорадка, воспалительные изменения в крови
2.5.Физикальные особенности	Сухие, свистящие хрипы	Сухие свистящие, жужжащие хрипы Эмфизема легких Признаки ХЛС
2.6.Эозинофилия крови и мокроты	+	-

2.7.Иммунограмма	IgE CD4, Il 4, 5, 13	IgM, G CD8, Il 6, 8, TNFα
2.8.Ответ на лечение - ИГКС - Бета-агонистами, холинолитиками	 Выраженный В комбинированной терапии	 Незначительный, требуются более высокие дозы Хороший ответ в начале лечения в качестве монотерапии
2.9.Характер течения	Рецидивирующее	Прогрессирующее
3.Инструментальные характеристики		
3.1.Рентгенограмма легких	Диффузное усиление легочного рисунка, эмфизема	Усиление и деформация легочного рисунка, эмфизема, пневмофиброз
3.2.Показатели спирометрии - Индекс Тиффно - ОФВ1 -Проба с бронхолитиками	Обратимая бронхиальная обструкция Более 70% (норма) Более 80% (норма) Снижен – при неконтролируемой БА Положительная (прирост ОФВ1 более 12%)	Необратимая бронхиальная обструкция Менее 70% Менее 80% Отрицательная