КАРДИОМЕГАЛИЯ

Увеличение размеров сердца за счет его гипертрофии, дилятации, накопления продуктов обмена веществ в миокарде, выпота в перикарде или развития неопластического процесса.

Причины:

1. ГБ или вторичные АГ
2. ИБС, в том числе аневризма сердца
3. Миокардиты
4. Перикардиты и невоспалительные выпоты в полости перикарда
5. Пороки сердца (врожденные и приобретенные)
6. Кардиомиопатии (первичные и вторичные)
7. Легочное сердце
8. Спортивное сердце
9. Эндокринопатии (тиреотоксикоз, гипотиреоз, гиперпаратиреоз, акромегалия, феохромоцитома, сахарный диабет)
10. Болезни накопления (амилоидоз, гемохроматоз, гликогеозы, болезнь Фабри, саркоидоз)
11. Опухоли сердца (миксома, рабдомиома, лейомиома, фиброма, сарокома) и метастазы (при раке молочной железы, легких, меланоме)
12. Токсического генеза (цитостатики – циклофосфан, доксирубицин, герцептин; кобальт, кокаин, алкоголь, уремия)
13. Болезни крови (анемия, лейкозы, лимфомы)
14. Нарушения питания (авитаминоз В1, голодание, ожирение)
15. Нервно-мышечныезаболвания (прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена, атаксия Фрирейха)

Методы обследования:

1. Клинические и физикальные данные
2. Лабораторные исследования (клинический, биохимический анализ крови, серологические, иммунологические исследования)
3. ЭКГ и суточное мониторирование ЭКГ
4. Эхо-КГ и допплерография
5. Рентгенография грудной клетки
6. МРТ сердца с отсроченным контрастирование
7. КТ
8. Коронароангиография
9. Сцинтиграфия миокарда
10. ПЭТ сердца
11. Эндомиокардиальная биопсия

Med 90:91–103, 1991.

Taylor RB: Difficult diagnosis 2. Philadelphia, WB Saunders. 1992.

